



Fisiologia del Gioco nei Mammiferi

Nei mammiferi, il gioco non è un semplice passatempo, ma una necessità biologica regolata da strutture cerebrali antiche.

- **Origine sottocorticale:** Gli studi del neuroscienziato Jaak Panksepp dimostrano che il circuito del gioco risiede nel sistema limbico, in particolare nell'**ipotalamo** e nell'**amigdala**. Questo significa che **il gioco è un'emozione primaria geneticamente programmata**.
- **Neurotrasmettitori coinvolti:** Oltre alla **dopamina (motivazione)**, il gioco stimola il rilascio di **oppioidi endogeni** (endorfine), che **mediano il piacere del contatto sociale**, e di **serotonina**, che **regola l'umore**.
- **Fattori di crescita:** L'attività ludica aumenta i livelli di **BDNF** (Fattore neurotrofico derivato dal cervello), una proteina che **stimola la nascita di nuovi neuroni e la sopravvivenza di quelli esistenti, soprattutto nella corteccia prefrontale**.



Impatto sullo Sviluppo Cognitivo Infantile


Nel bambino, il gioco trasforma la struttura fisica del cervello, guidando lo sviluppo delle funzioni cognitive superiori.

- **Sviluppo della corteccia prefrontale:** È l'area cerebrale che matura più tardi e controlla le funzioni esecutive. Il gioco allena la **regolazione emotiva, la pianificazione, la flessibilità cognitiva e il controllo degli impulsi**.
- **Apprendimento ed errore sicuro:** Il gioco crea una "zona di sicurezza viscerale" in cui il bambino può fallire senza reali conseguenze. Questo **riduce i livelli di cortisolo** (l'ormone dello stress), **ottimizzando l'ippocampo per l'immagazzinamento delle informazioni**.
- **Linguaggio e astrazione:** **Il gioco simbolico** (es. *fare finta di*) stimola le aree cerebrali dell'emisfero sinistro legate al linguaggio, poiché richiede la dissociazione tra l'oggetto reale (un bastone) e il suo significato mentale (una spada).

Sintomi da Deprivazione di Gioco


L'assenza di gioco durante le fasi critiche dello sviluppo altera la maturazione strutturale del cervello, producendo **gravi deficit comportamentali ed emotivi**.

- **Iperreattività allo stress:** La mancanza di gioco riduce la resilienza della corteccia prefrontale. I soggetti mostrano **picchi elevati di cortisolo e reazioni esagerate di attacco o fuga di fronte a stimoli ambientali nuovi o ambigui**.
- **Incompetenza sociale:** Nei mammiferi (inclusi i primati), la deprivazione impedisce l'apprendimento dei segnali di sottomissione o dominanza. Da adulti, questi individui **non riescono a integrarsi nei gruppi e manifestano aggressività inappropriata o paura patologica**.
- **Deficit delle funzioni esecutive:** Nei bambini, la carenza di gioco (specialmente quello libero e motorio) è fortemente correlata a difficoltà di **iperattività, scarso controllo degli impulsi e ridotta flessibilità cognitiva**, poiché i circuiti prefrontali rimangono sotto-stimolati.



Dal gioco alla Dipendenza

- Il passaggio dal gioco fisiologico alla **dipendenza patologica** (sia essa da videogiochi, definita *Gaming Disorder*, o da azzardo, nota come *Ludopatia* o *Gambling Disorder*) rappresenta un vero e proprio **"dirottamento" biologico dei circuiti cerebrali**.
- La transizione avviene quando un comportamento nato per l'esplorazione e il piacere si trasforma in un **automatismo compulsivo e distruttivo**



Il Meccanismo del "Dirottamento"

Nel gioco sano, la dopamina viene rilasciata per gratificare un successo o una scoperta. **Nella dipendenza**, il circuito della ricompensa viene sovrastimolato:

- **L'effetto dell'incertezza**: Paradossalmente, il cervello rilascia molta più dopamina durante l'**anticipazione del premio** e in presenza di un risultato imprevedibile (rinforzo intermittente), piuttosto che al momento della vincita effettiva. Il **"quasi successo"** (es. due simboli uguali su tre alla slot) viene registrato dal cervello come una mezza vincita, spingendo a riprovare immediatamente.
- **Downregulation recettoriale**: Di fronte a continue e massicce scariche di dopamina, il cervello si difende riducendo il numero di recettori per questo neurotrasmettitore o producendone meno. Questo porta alla **tolleranza**: il soggetto ha bisogno di stimoli sempre più lunghi, intensi o rischiosi per provare lo stesso livello di gratificazione iniziale.



Le Fasi della Transizione Neurobiologica


La dipendenza si instaura seguendo **tre fasi neuroadattative** che modificano la struttura cerebrale:

1. **Intossicazione e Craving (Gangli della Base):** Il comportamento attiva intensamente il **nucleo accumbens**. Il gioco diventa il focus centrale della vita, e l'**impulso a giocare (craving)** si accende automaticamente alla vista di stimoli correlati (es. suoni, luci, icone dello smartphone).
2. **Astinenza e Stato Negativo (Amigdala):** Quando non gioca, il livello di dopamina del soggetto crolla sotto la linea di base, attivando il sistema dello stress. L'amigdala diventa iperattiva, provocando sintomi di astinenza come **irritabilità, ansia, vuoto emotivo e depressione**. A questo punto, il soggetto non gioca più per cercare il piacere (rinforzo positivo), ma per alleviare il dolore e il malessere dell'astinenza (rinforzo negativo).
3. **Preoccupazione e Anticipazione (Corteccia Prefrontale):** La corteccia prefrontale, responsabile del controllo esecutivo e delle decisioni, subisce un **deficit funzionale**. Il soggetto perde la capacità di valutare le conseguenze a lungo termine, non riesce più a inibire l'impulso e continua a giocare nonostante i danni economici, sociali o relazionali evidenziati

Inseguendo la Dopamina Chasing Dopamine

- **La dipendenza e la smania** - per il telefonino o altro - dipendono da una complessa interazione di sostanze chimiche del cervello, in primis la **dopamina**, un neurotrasmettitore responsabile della **motivazione e del comportamento alla ricerca di ricompense**, ed essenziale per il cambiamento neuroplastico (che consente il **formarsi di un'abitudine o di una dipendenza**).
- **Ogni volta che il tuo telefono suona, e lo controlli per vedere un testo, un mi piace o un messaggio, il tuo cervello ti premia con una dose di dopamina.**
- **Col passare del tempo, la dopamina viene rilasciata sempre più precocemente e ogni telefonata provoca un'impennata della dopamina.**
La dopamina che precede l'azione **motiva l'utente creando la necessità e l'urgenza di agire**. Si determina così **la necessità di controllare e utilizzare il telefono sempre di più per ottenere la stessa risposta cerebrale**. Questo comportamento di **ricerca della ricompensa** fa perdere interesse in altre attività...

Il Sistema di ricompensa del cervello (la via della dopamina)



1 Area tegmentale ventrale - nel mesencefalo: produce dopamina e fa parte di una delle quattro principali vie della dopamina nel cervello - **attivata da droghe tra cui nicotina, alcol e oppioidi** (es.: eroina).

2 Nucleo accumbens - Una piccola regione del proencefalo dalle antiche origini evolutive, che aiuta a regolare le pulsioni di sopravvivenza come il cibo e la sete, attivato da droghe come cocaina, anfetamina, cannabinoidi (es. Cannabis) e oppiacei

3 Corteccia prefrontale - Parte del lobo frontale che è coinvolta in molte funzioni cognitive, tra cui memoria, linguaggio, pianificazione e processi decisionali


DIPENDENZA: IL CIRCUITO DELLA RICOMPENSA

I neuroni dopaminergici dell'**area tegmentale ventrale** proiettano a:

- **nucleus accumbens**, l'area più importante del controllo della ricompensa, situato nello **striato ventrale (VIA MESOLIMBICA)**
- **corteccia frontale**, in aree implicate nella regolazione del piacere, dell'euforia, della compulsione e altri meccanismi coinvolti nel rinforzo dello stimolo (**VIA MESOCORTICALE**)

I neuroni dopaminergici della **substantia nigra** proiettano a:

- **striato dorsale (VIA NIGROSTRIATALE)** e trasformano lo stimolo di ricompensa ricorrente in abitudine



BRS:
Brain Reward System

La Dopamina (Psicosi e comportamento)

sezione sagittale mediana

sezione coronale




Figura 25.1. Le principali vie dopaminergiche cerebrali implicate nelle manifestazioni cliniche della schizofrenia. Da Kandel (2000) ridisegnato

DISTURBI DA DIPENDENZA E CORRELATI ALL'USO DI SOSTANZE




- ☐ Alcol
- ☐ Caffaina
- ☐ Cannabis
- ☐ Allucinogeni
- ☐ Inalanti
- ☐ Oppiacei
- ☐ Sedativi
- ☐ Ipnotici e ansiolitici
- ☐ Stimolati
- ☐ Tabacco
- ☐ Altre sostanze sconosciute

Dipendenze senza sostanza

- ▶ Gioco d'azzardo patologico
- ▶ Shopping compulsivo
- ▶ Nuove dipendenze tecnologiche (internet, social network, videogiochi, cellulare, TV)
- ▶ Dipendenza dal lavoro ('workaholism')
- ▶ Dipendenza dal sesso (sex-addiction)
- ▶ Dipendenza dalle relazioni affettive







Criteri Diagnostici DSM-V 312.31 (F63.0)



A. Comportamento da gioco d'azzardo problematico ricorrente e persistente che porta a stress o a un peggioramento clinicamente significativo, come indicato dalla presenza nell'individuo di 4 (o più) dei seguenti sintomi per un periodo di almeno 12 mesi

1. Necessità di giocare una quantità crescente di denaro con lo scopo di raggiungere l'eccitazione desiderata 2. È irritabile o irrequieto quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d'azzardo 3. Ha effettuato ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o interrompere il gioco d'azzardo 4. È spesso preoccupato per il gioco d'azzardo (per esempio, ha pensieri persistenti di rivivere esperienze passate del gioco d'azzardo, di problematiche o di pianificazioni future, pensando come ottenere danaro con cui giocare)	5. Spesso gioca quando si sente in difficoltà (per esempio, assenza di speranza, in colpa, ansioso, depresso) 6. Dopo aver perso soldi al gioco, spesso torna un altro giorno (perdite "inseguite") 7. Racconta bugie per nascondere il coinvolgimento nel gioco d'azzardo 8. Ha messo a repentaglio o ha perso una relazione significativa, il lavoro, lo studio o una opportunità di carriera a causa del gioco d'azzardo 9. Si basa su altri per cercare denaro per alleviare le disperate situazioni finanziarie causate dal gioco d'azzardo
--	---

LO SCHEMA DI CUSTER E LE FASI DEL GIOCO

- ☐ Fase Vincente
- ☐ Fase Perdente
- ☐ Chasing
- ☐ Fase Della Disperazione
- ☐ Fase Della Perdita di Speranza
- ☐ Fase Critica
- ☐ Fase Della Crescita

Croce M. (2001), Il caso del gioco d'azzardo: una droga che non esiste, dei danni che esistono, in *Personalità/Dipendenze*, Fasc. II, pp. 225-242
 Custer R.L. (1982), *Pathological Gambling*, in Whitfield A., *Patients with Alcoholism and other Drug Problems*, Year Book Publ.
 Custer R.L. (1984), Profile of the pathological gambler, in *Journal of Clinical Psychiatry*, 45(12), pp 35-3



Questo susseguirsi di fasi non va però letto come un percorso obbligato: è possibile che un giocatore rimanga ad un livello in cui il gioco è sporadico e occasionale, o che altri giocatori arrivino a diventare problematici o sfocino nella patologia



Gambling Dual Disorder: A Dual Disorder and Clinical Neuroscience Perspective

Nestor Szerman^{1*}, Francisco Ferré², Ignacio Basurto-Villamor³, Pablo Vega⁴, Beatriz Medias⁵, Rodrigo Marín-Navarrete⁶ and Celso Arango⁶

¹WADD, WFA Section Dual Disorders, Institute of Psychiatry and Mental Health Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain, ²Institute of Psychiatry and Mental Health Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain, ³Institute of Addictions, Madrid Salud, Madrid, Spain, ⁴National Institute of Psychiatry Ramón de la Fuente, Mexico City, Mexico, ⁵Institute of Psychiatry and Mental Health Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ISGM, CIBERSAM, School of Medicine, Universidad Complutense, Madrid, Spain

la prevalenza di GD nei pazienti psichiatrici ricoverati o negli individui che hanno ricevuto un trattamento per SUD è rispettivamente del 6,9% e del 4,3%.



Grant JE, Levine L, Kim D, Potenza MN. Impulse control disorders in adult psychiatric populations. *Am J Psychiatry*. (2005) 162:2104-8. doi:10.1176/appi.ajp.162.11.2104
 Covatta S, Hatzis JK. Pathological and problem gambling in substance use treatment: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions (NESARC). *Am J Addict*. (2015) 26:467-74. doi:10.1111/ajad.12242

il 96% delle persone con GD ha uno o più altri disturbi psichiatrici e il 64% ne ha tre o più

ansia (92%)
 depressione (89%)
 disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD, 85%)
 fobia sociale con ossessivo- sintomi compulsivi (75%)
 l'uso di sostanze (tabacco, alcool o cocaina)

Gratwick-Harris V, Guntzburger J, Pineda-Alfaro L, Martinez L, Martinez S, Billo J. Association between internet gaming disorder or pathological video-game use and comorbid psychopathology: a comprehensive review. *Int J Environ Res Public Health*. (2014) 11:666. doi:10.3390/ijerph11060666
 Rodriguez-Margalec A, Bero M, Volberg S. Comorbid psychological gambling, mental health, and substance use disorders health-care services provision by clinical specialty. *J Subst Abuse Treat*. (2017) 68:10-15. doi:10.1016/j.jsat.2017.05.004
 Roth CL, Winters K, Van Patten S. A review of gambling disorder and substance use disorders. *Behav Assess Rev*. (2014) 38:1-11. doi:10.1002/abm.12242

Gratwick-Harris V, Guntzburger J, Pineda-Alfaro L, Martinez L, Martinez S, Billo J. Association between internet gaming disorder or pathological video-game use and comorbid psychopathology: a comprehensive review. *Int J Environ Res Public Health*. (2014) 11:666. doi:10.3390/ijerph11060666

IL GAMBLING DUAL DISORDER: «DISTURBO CEREBRALE»

Tutti i comportamenti gratificanti necessari per la sopravvivenza si basano sul BRS

Simile ai SUD, la GD è una conseguenza dell'interazione tra una vulnerabilità genetica e fattori ambientali, causando cambiamenti adattativi duraturi nella funzione BRS

Solo una minoranza di individui che provano effetti piacevoli da giochi, gioco d'azzardo, cibo, sesso o shopping sviluppa comportamenti problematici o ne diventa dipendente

...dipendenza implica un insieme di processi interconnessi che influenzano diverse funzioni mentali...

Volzow ND, Koob GF, McLellan AT. Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. *N Engl J Med*. (2016) 374:363-71. doi: 10.1056/NEJMe1511480

Storzman NS, Martinez-Raga J, Peris L, Roncero C, Barrio I, Vega P, et al. Rethinking dual disorders/psychology. *Addict Dis Treat*. (2013) 12:1-10. doi: 10.1097/ADT.0b013e31826e7bde

Leyton M, Verina P. Dopamine ups and downs in vulnerability to addiction: a neurodevelopmental model. *Trends Pharmacol Sci*. (2014) 35:268-76. doi: 10.1016/j.tips.2014.04.002

Kuss DJ, Griffiths MD. Online gaming addiction in children and adolescents: a review of empirical research. *J Behav Addict*. (2012) 1:3-22. doi: 10.1556/JBA.1.2012.1.1

Moccia L, Petrucci M, De Crescenzo F, De Risio L, di Nuzzo L, Martinotti G et al. Neural correlates of cognitive control in gambling disorder: a systematic review of fMRI studies. *Neurosci Biobehav Rev*. (2017) 78:104-16. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.04.025

IL GAMBLING DUAL DISORDER: «DISTURBO CEREBRALE»


- ☐ il BRS è associato a sistemi biologici fondamentali (sistema colinergico oppioide, endocannabinoide e nicotinico), legati alla sopravvivenza e a funzioni mentali, che, se interrotte, possono dare origine a diversi disturbi mentali (come GD)
- ☐ Ciò può verificarsi non solo nella dipendenza da sostanze, ma anche in altri disturbi mentali e comportamentali
- ☐ Gli individui che sono dipendenti dal gioco d'azzardo mostrano una sintomatologia clinica correlata con reperti neurobiologici: minore memoria di lavoro e capacità decisionale, riduzione della funzione visiva e uditiva, insieme a compromissione della corteccia prefrontale (PFC) e deficit del BRS.

- Volzow ND, Koob GF, McLellan AT. Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. *N Engl J Med*. (2016) 374:363-71. doi: 10.1056/NEJMe1511480
- Storzman NS, Martinez-Raga J, Peris L, Roncero C, Barrio I, Vega P, et al. Rethinking dual disorders/psychology. *Addict Dis Treat*. (2013) 12:1-10. doi: 10.1097/ADT.0b013e31826e7bde
- Leyton M, Verina P. Dopamine ups and downs in vulnerability to addiction: a neurodevelopmental model. *Trends Pharmacol Sci*. (2014) 35:268-76. doi: 10.1016/j.tips.2014.04.002
- Kuss DJ, Griffiths MD. Online gaming addiction in children and adolescents: a review of empirical research. *J Behav Addict*. (2012) 1:3-22. doi: 10.1556/JBA.1.2012.1.1
- Moccia L, Petrucci M, De Crescenzo F, De Risio L, di Nuzzo L, Martinotti G et al. Neural correlates of cognitive control in gambling disorder: a systematic review of fMRI studies. *Neurosci Biobehav Rev*. (2017) 78:104-16. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.04.025

GD e PROCESSO DECISIONALE

Il processo decisionale è una componente essenziale della nostra vita quotidiana e diventa disfunzionale in una moltitudine di condizioni psichiatriche (disturbo del controllo degli impulsi, psicosi, disturbo bipolare, ADHD e alcune dipendenze, inclusa la GD).

Una vasta rete cerebrale che coinvolge il BRS, la corteccia prefrontale (PFC), l'amigdala e il nucleo accumbens viene attivata per ottenere un processo decisionale efficiente



Valtort M, Tena S, Wang G, Fowler H, Tchang S, Goldstein R, et al. Positive emotionality is associated with baseline modulation in orbitofrontal cortex and its regions of the default network. *Mol Psychiatry*. 2011;16:858-25. doi: 10.1038/mp.2011.20
Doherty PW, Fryer TJ, Bruchman J, Belmont AM, Thibault EM, Lister K, et al. Nucleus accumbens D2 receptors predict risk impulsivity and cocaine reinforcement. *Science*. 2007;315:1267-70. doi: 10.1126/science.1137907
Jupp R, Doherty PW. Behavioral endophenotypes of drug addiction: biological insights from neuroimaging studies. *Neuropharmacology*. 2014;79:10-27. doi: 10.1016/j.neuropharm.2013.05.041

GD: DECORSO

Variabile: episodico o cronico

è stata segnalata la crescita del volume di gioco quando sono presenti crisi economiche e sociali e una forte insicurezza sul futuro



Verdura Vincino EJ, Fernandez-Navarro P, Petry N, et al. Differences between early-onset pathological gambling and later-onset pathological gambling: data from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). *Addiction*. 2014;109:807-813. [PubMed: 25006638]

Breen RB, Zimmerman M. Rapid onset of pathological gambling in machine gamblers. *Journal of gambling studies* / co-sponsored by the National Council on Problem Gambling and Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming. 2002;18:31-43.

Shrout WS. Natural recovery and treatment-seeking in pathological gambling: results of two U.S. national surveys. *Am J Psychiatry*. 2006;163:297-302. [PubMed: 16449485]

GD: FATTORI DI RISCHIO

- ☐ GENERE MASCHILE
- ☐ ETÀ PIÙ GIOVANE
- ☐ ABITARE IN ZONE RURALI
- ☐ BASSO STATO SOCIOECONOMICO
- ☐ ESPOSIZIONE PRECOCE ALLE ATTIVITÀ DI GIOCO
- ☐ DISPONIBILITÀ DI GIOCO
- ☐ COMORBIDITÀ PSICHIATRICA, COMPRESI I SUD
- ☐ EVENTI AVVERSI NELL'INFANZIA
- ☐ UNA STORIA FAMILIARE DI GD O SUD
- ☐ COMORBIDITÀ CON UN DISTURBO DI PERSONALITÀ

Blanco C, Myers J, Kessler KS. Gambling, disordered gambling and their association with major depression and substance use: a web-based cohort and twin-sibling study. *Psychological medicine*. 2012; 42:497-508. [PubMed: 21835089]



Martins SS, Stein CL, Lee GJ, et al. Environmental influences associated with gambling in young adulthood. *Journal of urban health: bulletin of the New York Academy of Medicine*. 2013; 90:130-140. [PubMed: 23895654]

Volberg RA. The prevalence and demographics of pathological gamblers: implications for public health. *American journal of public health*. 1994; 84:237-241. [PubMed: 8296947]

Widom FW, Rounsley GD, Wozniak WT, et al. Risk factors for pathological gambling. *Addictive behaviors*. 2004; 29:323-335. [PubMed: 14732420]

Fattori predittivi: lasciano prevedere la possibilità che si sviluppi il disturbo di gioco problematico o patologico:

- ☐ credenze sul gioco
- ☐ fattori correlati all'esperienza di gioco
- ☐ scarse conoscenze sulla probabilità o errori cognitivi

Brown BA, Brown DF. Predictors of lottery gambling among American college students. *The Journal of social psychology*. 1994; 134:339-347. [PubMed: 8057634]

Chen M, Liu W, Cui X, et al. Gambling Disorder and Minority Populations: Prevalence and Risk Factors. *Current Addiction Reports*. 2016; 3:280-292.

Bonnet A, Paves de Castro I, Fernandez-Piquero J, et al. Pathological gambling and DNA polymorphic markers at MAO-A and MAO-B genes. *Molecular psychiatry*. 2000; 5:105-109. [PubMed: 10675777]

Shuttle WS, Eism S, Kim H, et al. A twin study of the association between pathological gambling and antisocial personality disorder. *Journal of abnormal psychology*. 2001; 110:297-308. [PubMed: 11558024]

IMPULSIVITÀ E GD


- Nonostante la convinzione comune che non esista una personalità che crea dipendenza, gli individui con dipendenza dal gioco mostrano tratti della personalità (endofenotipi), come la ricerca di sensazioni e l'impulsività
- L'impulsività emerge dall'evidenza clinica come il più importante tratto di personalità associato alla GD e quello che ha un'influenza sulla gravità del disturbo
- Può anche essere considerato un indicatore di vulnerabilità.



Ioannidis K, Hook R, Wickham K, Grant JE, Chamberlain SR. Impulsivity in gambling disorder and problem gambling: a meta-analysis. *Neuropsychopharmacology*. (2019) 44:1354-61. doi: 10.1038/s41386-019-0393-9

IMPULSIVITÀ E GD

- Una recente meta-analisi ha rivelato un'accresciuta impulsività nella GD e problemi di gioco d'azzardo (individui a rischio) in una serie di domini cognitivi (inibizione motoria, inibizione dell'attenzione, attualizzazione e compiti decisionali), in linea con i modelli neurobiologici. Questi dati hanno inoltre dimostrato un'elevata impulsività decisionale anche in soggetti con problemi di gioco d'azzardo meno gravi



Ioannidis K, Hook R, Wickham K, Grant JE, Chamberlain SR. Impulsivity in gambling disorder and problem gambling: a meta-analysis. *Neuropsychopharmacology*. (2019) 44:1354-61. doi: 10.1038/s41386-019-0393-9

L'Era Digitale: Un Nuovo Territorio per il Gioco

- **Accessibilità 24/7:** Eliminazione delle barriere fisiche e temporali.
- **Anonimato:** Possibilità di giocare in solitudine, ritardando l'identificazione del problema.
- **Varietà di giochi:** Casinò online, scommesse sportive, poker online, ecc..
- **Targeting:** Utilizzo di algoritmi per personalizzare l'esperienza di gioco.



Velocità e Immediatezza: L'Impatto sul Cervello

- I giochi online offrono gratificazione immediata e frequente ("scarica di dopamina").
- Cicli di scommessa più rapidi intensificano il rinforzo della dipendenza.
- Alterazione dei circuiti cerebrali legati alla regolazione emotiva e al controllo degli impulsi.
- I comportamenti impulsivi si rafforzano, rendendo il cervello più vulnerabile.



Conseguenze: Oltre la Perdita Economica

- Danni economici devastanti, che impattano anche sulla famiglia.
- Salute mentale: forte correlazione con ansia, depressione, insonnia.
- Rischio di tentativi di suicidio.
- Comorbidità con abuso di sostanze (alcol, droghe).
- Compromissione delle relazioni sociali, familiari e lavorative.





**Gioco d'Azzardo
Patologico è una
Malattia "Sistemica"
Grave**